

### Przygotowanie do badania kolonoskopii z preparatem Fortrans

**Przed zastosowaniem preparatu FORTTRANS należy przeczytać ulotkę informacyjną dołączoną do preparatu.**

#### Na 7 dni przed badaniem należy:

- Przerwać przyjmowanie preparatów żelaza.
- Osoby przyjmujące leki antyagregacyjne – typu Aspiryna, Acard, Ticlid, itp. – powinny przestać je przyjmować po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, który zlecił stosowanie w/w leków.
- Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (Sintrom, Syncumar, Acenocumarol, Warfaryna, itp.) konieczny jest kontakt z lekarzem prowadzącym leczenie przeciwzakrzepowe i zmiana leków na heparynę niskocząsteczkową (Fraxiparyna, Clexane).
- Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania.

#### Trzeci i drugi dzień przed badaniem:

- Zalecana dieta lekkostrawna, **bez świeżych owoców, warzyw, ciemnego pieczywa** i innych produktów z dużą zawartością błonnika. **Nie należy spożywać w żadnej postaci owoców i warzyw pestkowych, takich jak winogrona, pomidory, kiwi, truskawki oraz pestek, siemienia lnianego i maku.** Pestki i nasiona mogą przykleić się do powierzchni jelita i utrudniać ocenę w trakcie badania.

#### Dzień przed badaniem:

- W przeddzień badania należy przyjąć koniecznie leki, które przyjmujecie Państwo na stałe (np. „leki nasercowe”, „na nadciśnienie”, „na prostatę”)!
- Można zjeść tylko śniadanie, do południa dieta bez mleka, płynna – dokładnie zmiksowane zupy, tzw. zupa krem, kisiel, rosół. Nie należy pić soków owocowych i napojów gazowanych. Inne napoje można pić w dowolnej ilości.
- W godzinach popołudniowych 14.00-15.00 zgodnie z instrukcją należy przygotować 2 litry roztworu Fortrans, rozpuszczając 2 torebki każdą z torebek w 1 litrze NIEGAZOWANEJ wody. Przygotowany roztwór należy wypić małymi dawkami w ciągu 5-6 godzin. Preparat jest niesmaczny, zdaniem pacjentów łatwiej jest wypić roztwór schłodzony, z dodatkiem soku z cytryny. W trakcie picia roztworu Fortransu można pić inne płyny (woda, herbata).
- Jeżeli badanie wykonywane jest następnego dnia w godzinach rannych – nie należy spożywać posiłków.
- Jeżeli badanie wykonywane jest następnego dnia **w godzinach popołudniowych**, należy 2 litry preparatu wypić w godzinach popołudniowych dzień przed badaniem, a 2 pozostałe litry w godzinach porannych w dniu badania.

**Ostatni litr płynu Fortrans należy wypić między 5 a 6 godziną przed badaniem, tzn.**

1. Jeśli badanie jest zaplanowane na godzinę 14, trzeci litr należy wypić między godziną 5 a 7 rano, natomiast ostatni, czwarty litr preparatu Fortrans należy wypić między godziną 8 a 9 rano.
2. Jeśli badanie jest o godzinie 9 rano ostatni, czwarty litr preparatu Fortrans należy wypić między godziną 3 i 4 rano.

**Właściwie przeprowadzony przez pacjenta proces oczyszczania jelit jest niezbędny do wykonania szczegółowego badania. Zalegające resztki pokarmu mogą zasłonić istotne zmiany chorobowe, które wykrywa badanie.**

- Od chwili wypicia roztworu NIE NALEŻY nic jeść aż do momentu wykonania badania.
- Można pić dowolną ilość NIEGAZOWANEJ wody, ewentualnie słabej herbaty, herbat ziołowych.

#### **W dniu badania:**

- Rano należy przyjąć leki, które przyjmujecie Państwo na stałe (np. naserkowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwpadaczkowe) popijając 1-2 łyżkami wody.
- Należy być na czczo (bez żadnego jedzenia). Spożywanie roztworu przeczyszczającego, należy zakończyć 5 godzin przed badaniem. Nie należy przyjmować jakichkolwiek posiłków, natomiast wodę można pić do 2 godzin przed badaniem.
- Jeżeli badanie jest w godzinach popołudniowych, przyjmowanie preparatu Fortrans należy tak rozłożyć, aby ostatni litr wypić między 5 a 6 godziną przed badaniem.
- Jeśli badanie będzie wykonane w znieczuleniu ogólnym dożylnym picie płynów również należy skończyć na 5-6 godzin przed badaniem.
- Reakcją organizmu na przyjmowanie roztworu Fortransu będą liczne wypróżnienia, na koniec treścią płynną. W przypadku trudności z przygotowaniem się do badania, w szczególności w przypadku pogorszenia samopoczucia w trakcie przygotowania, konieczny jest kontakt z lekarzem.

#### **Po badaniu:**

- Jeśli pojawi się dyskomfort w postaci wzdęć, kurczowych bólów brzucha spowodowanych prymy powietrze wprowadzone do jelita podczas badania, należy zastosować Espumisan w dawce 3 x 2 tabl. lub No-Spa w dawce 3 x 1 tabl.
- Po zakończeniu badania zalecana dieta lekkostrawna.
- W dniu badania, w przypadku otrzymania środków uspokajających, nie należy przez kilka godzin prowadzić samochodu lub innych urządzeń.

**W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z rejestracją doktorA.**